

KNA

الرابطة الكويتية لأمراض الكلى
Kuwait Nephrology Association

الإلتهابات البولية



الأسباب:

1. عيوب في الكلى والمسالك البولية: مثلاً ارتجاع مثاني حالي، خلل في ميكانيكية المثانة، مرض التكييس الكلوي التعددي، وانسداد نتيجة حصوات أو تضخم البروستاتا.
2. الحمل.
3. داء السكري.
4. الجماع وخصوصاً مع استخدام الحاجب.
5. سن اليأس.
6. قسطرة المثانة مثلاً لبعض الحالات المصابة بالجلطات الدماغية.

الأعراض:

1. حرقان عند التبول.
2. رائحة كريهة للتبول.
3. الشعور بالحاجة المتكررة والعاجلة للتبول.
4. دم في البول.
5. ألم أسفل البطن (مكان المثانة) أو الجنب (مكان الكلى).
6. حمى ورجفان وغثيان (في حال التهاب الكلى).
7. افرازات صديدية أو تغير في لون البول.

التشخيص:

1. تحليل بول باستخدام الشريط وعينة أخرى لمزرعة البول.

2. الأشعة:

- أشعة البطن (KUB): لاستبعاد بعض حصوات الكلى.
- سونار البطن لتشخيص توسع حوض الكلى والحالب والحصوات.
- الأشعة الملونة (IVU): تبين حجم الكلى وشكله والمسالك البولية ومكان الانسداد.
- الأشعة المقطعية (CT scan): تشخيص نكان الحصوة والحصوات الصغيرة التي لا ترى في الأشعة البسيطة والسونار.
- فحص صبغة المثانة (VCUG): لتشخيص ارتجاع البول.

3. تخطيط المثانة (urodynamics).

4. المنظار (cystoscopy): يحدده طبيب المسالك البولية لحالات محدودة.